Sani-Cloth Chlor

Lingettes désinfectantes à base d'hypochlorite de Sodium

PDI-XP00297

Composition

- Lingettes à base d'hypochlorite de sodium
- Concentration en chlore actif > 1,2° chlorométrique

Caractéristiques et avantages

- Produit biocide.
- 50 lingettes prêtes à l'emploi :
  - ◊ Maîtrise des contaminations croisées. Boîte distributrice hygiénique dotée d'un couvercle profond protégeant de toutes contaminations extérieures.
  - ◊ Réduction du risque professionnel via l'élimination des risques d'erreur de dosage des produits désinfectants à base de chlore.
  - ◊ Economie d'utilisation (absence de dilution, gain de temps).
  - ◊ Supports muraux et supports chariots permettant de positionner le désinfectant aux points stratégiques
  - ◊ Tests de stabilité à partir du liquide extrait de la lingette et en temps réel
- Activité désinfectante :
  - ◊ Conforme à la norme EN 13704 en condition de propreté en 30 s (>5 log)
  - ◊ Conforme à la norme EN 13704 en condition de saleté en 1 min (>4 log)
  - ◊ Tests de surface en conditions extrêmes (substance organique interférente 5%) répliquant l'application réelle de la lingette

Domaines d'utilisation

- Recommandé pour la désinfection des surfaces (bloc opératoire, imagerie interventionnelle, patient en isolement protecteur ou septique, cas d'infection à Clostridium difficile…)

Données techniques et commerciales

Référence de commande	PDI-XP00297
Description	Sani- Cloth Chlor boîte de 50 lingettes
Conditionnement carton	6 boîtes
Conditionnement palette	64 cartons
Dimensions des lingettes	200mm x 200mm – grammage : 40g/m² spunlace

PDI-XP00297 2012-09FR

Hospidex France - Athélia 4, 297 av.du Mistral - 13600 La Ciotat - T +33(0)4 42 08 50 51 - F +33(0)4 42 83 95 98 - info@hospidexfrance.com

Activité	Micro-organismes Tests de surface *EPA	Temps de contact	
		Cond. Pro-preté	Cond. Saleté
Bactéricide	*Acinetobacter baumannii* - Multi-Drug Resistant (ATCC 19606)		1mn
	Campylobacter jejuni (ATCC 29428)		1mn
	Escherichia coli with extended beta-lactamase resistance (ESBL) (ATCC BAA-196)		1mn
	Escherichia coli (E. coli) O157:H7 (ATCC 35150)		1mn
	Klebsiella pneumoniae (ATCC 4352)		1mn
	Klebsiella pneumoniae - Carbapenem Resistant (ATCC BAA-1705)		1mn
	Klebsiella pneumoniae with extended beta-lactamase resistance (ESBL) (ATCC 700603)		1mn
	Legionella pnemophilia (ATCC 33153)		1mn
	Listeria monocytogenes (ATCC 19117)		1mn
	Methicillin resistant Staph aureus (MRSA) HA (ATCC 33592)		1mn
	Methicillin resistant Staph aureus (MRSA) CA NARSA NRS384 Genotype 300		1mn
	Methicillin resistant Staph aureus (MRSA) CA NARSA NRS123 Genotype 400		1mn
	Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442)		1mn
	Salmonella enterica (ATCC 10708)		1mn
	Staphylococcus aureus (ATCC 6538)		1mn
	Streptococcus pneumoniae - Penicillium Resistant (ATCC 700677)		1mn
	Streptococcus pyogenes (ATCC 12344)		1mn
	Vancomycin Resistant *Staphylococcus aureus* (VISA) HIP 5836		1mn
	Vancomycin Resistant *Staphylococcus aureus* (VRSA) NARSA VRS1		1mn
	Vancomycin Resistant *Enterococcus faecalis*-VRE (ATCC 51575)		1mn
Fongicide	*Aspergillus niger* (ATCC 16404)		4mn
	Candida albicans (ATCC 10231)		4mn
	Trichophyton mentagrophytes (ATCC 9533)		4mn
Virucide	Adenovirus Type 2 (ATCC VR-5)		1mn
	Canine parvovirus (ATCC VR-2017) Strain Cornell		1mn
	Hepatitis A Virus (HAV) Strain HM-175		1mn
	Hepatitis B Virus (HBV) Human - Duck HBV Surrogate		1mn
	Hepatitis C Virus (HCV) Human BVD		1mn
	Herpes Simplex Type 2		1mn
	HIV-1 type 1 (At 20° -25° C)		1mn
	Human Coronavirus (ATCC VR-740)		1mn
	Influenza A (Avian) H5N1		1mn
	Influenza A/Hong Kong		1mn
	Norovirus Virus (as Feline Calicivirus) (ATCC VR-782)		1mn
	Poliovirus type 1 (ATCC VR-1000)		1mn
	Respiratory Syncytial virus (RSV) (ATCC VR-26)		1mn
	Rhinovirus Type 37		1mn
	Rotavirus (Strain WA)		1mn
Tuberculocide	*Mycobacterium bovis* - BCG (TB) (at 20° C)		2mn
SPORICIDE	**EN13704**	**30sec (>5 reduction log)**	**1mn (>4 reduction log)**

*EPA (Environmental Protection Agency/USA): Test lingette selon la méthodologie recommandée par EPA, répliquant l'utilisation de la lingette en condition d'application réelle : 1 lingette désinfectante + 10 boites de pétri contaminées (stérilisées au préalable). Une face de la lingette est utilisée pour décontaminer les 5 premières boites et l'autre face de cette même lingette est appliquée sur les 5 autres boites de pétri. Après un temps de contact déterminé, l'activité désinfectante de la lingette est neutralisée sur les boites de pétri et le titrage des micro-organismes effectué afin de déterminer l'efficacité désinfectante de la lingette.

Recommandations :

- Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Le port de gants de protection est fortement recommandé lors de l'utilisation. Se laver les mains au savon après utilisation du produit. En cas de rougeur ou d'irritation, cesser son utilisation.
- Ne pas utiliser avec ammoniac ou acide
- L'utilisation prolongée sur métaux peut causer corrosion et/ou décoloration
- Eviter application sur métaux souples, tissus et lentilles
- Effectuer un test de compatibilité au préalable sur une petite surface
- Conservation après ouverture : 1 mois (efficacité maintenue 1 mois après ouverture sur un produit approchant sa date de péremption)
- A conserver droit, à l'abri de l'humidité et à température ambiante (23°)

Mode d'emploi :

Hospidex France - Athélia 4, 297 av.du Mistral - 13600 La Ciotat - T +33(0)4 42 08 50 51 - F +33(0)4 42 83 95 98 - info@hospidexfrance.com